

**COMPOSICIÓN.**

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua	8,8 % p/p
Óxido de calcio (CaO) complejoado por LS	8,8 % p/p
Boro (B) soluble en agua	0,9 % p/p

Intervalo de estabilidad de la fracción complejada : pH 3,5-9.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS.

Totalmente soluble

Densidad: 1,37 g/cc

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS.

El calcio es esencial para la formación de la pared celular de las células vegetales. Está involucrado en la respiración de la planta, la translocación de fotosintatos desde las hojas a los órganos de fructificación, la fijación de frutos y la absorción de agua, entre otras funciones vitales.

El boro incrementa la actividad celular y es necesario para la síntesis de proteínas y el transporte de azúcares. Tiene funciones imprescindibles en las reacciones metabólicas relacionadas con la fijación de flores y la maduración de frutos.

CALCITOP® está indicado para mantener los niveles adecuados de calcio y boro en la planta, evitando las deficiencias o desequilibrios en su asimilación y los importantes problemas que esto conlleva.

RECOMENDACIONES DE USO. DOSIS.

- General: 250-500 cc/hl en aplicación foliar ; 5-15 l/ha en fertirrigación.
- Cítricos y tropicales : 300-500 cc/hl en aplicación foliar ; 10-15 l/ha en fertirrigación.
- Frutales y olivo : 300-500 cc/hl en aplicación foliar ; 10-15 l/ha en fertirrigación.
- Vid : 250-500 cc/hl en aplicación foliar ; 10-15 l/ha en fertirrigación.
- Cultivos hortícolas : 200-400 cc/hl en aplicación foliar ; 5-10 l/ha en fertirrigación.
- Berries y frutos rojos : 250-400 cc/hl en aplicación foliar ; 5-10 l/ha en fertirrigación.
- Cultivos extensivos : 2-4 l/ha.

Aplicar desde la salida de la cuarta hoja verdadera hasta el final del ciclo, cada 10-15 días. Reducir o aumentar la cadencia según las recomendaciones técnicas.

Se recomienda complementar con aplicaciones al riego.

ENVASES DISPONIBLES: 1 L, 5 L, 20 L