

COMPOSICIÓN.

Boro (B) soluble en agua 11 % p/p

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS.

Totalmente soluble
Densidad: 1,35 g/cc
pH: 7,5

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS.

El boro es un micronutriente esencial que interviene en múltiples procesos biológicos esenciales de la planta, como el transporte y metabolismo de carbohidratos. Su deficiencia o mala absorción produce diversas fisiopatías.

NACAR® BORO SL es una solución de boro etanolamina de alta concentración y asimilación muy rápida. Favorece el desarrollo de yemas y hojas, la floración y el cuajado de frutos.

NACAR® BORO SL corrige eficazmente las posibles carencias de boro a lo largo de todo el ciclo en los cultivos más exigentes: alfalfa, algodón, apio, col, espárrago, fresa, judía, lechuga, manzano, olivo, patata, pimiento, tomate, vid, zanahoria, etc.

RECOMENDACIONES DE USO. DOSIS.

NACAR® BORO SL puede usarse en todo tipo de cultivos exigentes en boro.

- APLICACIÓN FOLIAR: 100-300 cc/hl.
- FERTIRRIGACIÓN : 2-3 l/ha/aplicación.

Deben realizarse aplicaciones a dosis mínimas para mantener niveles adecuados y prevenir deficiencias; aplicar a dosis más elevadas cuando se presenten estados carenciales. Realizar 2-3 aplicaciones desde el inicio de la actividad vegetativa.

Aplicar según las necesidades del cultivo durante los momentos de mayor crecimiento vegetativo y en la fase de cuajado de frutos. En frutales caducifolios aplicar tras la cosecha para mejorar la fecundación y el cuajado de frutos de la siguiente temporada.