



COMPOSICIÓN.

Decocción de cola de caballo (*Equisetum arvense*) 2,00 % p/v
Quitosano purificado 2,00 % p/v

Productos para la gestión de plagas y enfermedades.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS.

Totalmente soluble
Densidad: 1 g/cc
pH: 3,7

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS.

EQUITRON-S contiene principios activos naturales con actividad fungicida y elicitors del mecanismo de defensa de las plantas frente a plagas y enfermedades. La mezcla de cola de caballo y quitosano tiene un efecto sinérgico que potencia su actividad y amplía su espectro de acción para el control de enfermedades.

SUSTANCIA BÁSICA (*Equisetum arvense*). Reglamento de ejecución nº 462/2014 de la Comisión. Se puede usar con arreglo a las condiciones especificadas en el informe SANCO/12386/2013 por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.
SUSTANCIA BÁSICA (Quitosano). Reglamento de ejecución nº 563/2014 de la Comisión. Se puede usar con arreglo a las condiciones especificadas en el informe SANCO/12388/2013 por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

RECOMENDACIONES DE USO. DOSIS.

· APLICACIÓN FOLIAR : Aplicar de forma preventiva a la dosis de 200-400 cc/hl o de forma curativa cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad a razón de 400-800 cc/hl.

Puede repetirse el tratamiento en caso de necesidad cada 7 días.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Frutales (Manzano y melocotonero)	Roya o sarna (<i>Venturia inaequalis</i>), cenicilla o oídios (<i>Podosphaera leucotricha</i> ; <i>Erysiphe necator</i>), abolladura o lepra del melocotonero (<i>Taphrina deformans</i>)	400-800 cc/hl	Comenzar las aplicaciones foliares al inicio de la brotación con condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad. 2-6 aplicaciones cada 7 días durante el cultivo.
Viña	Mildiu (<i>Plasmopara viticola</i>), cenicilla o oídio (<i>Erysiphe necator</i>)		
Cucurbitáceas	Oídio (<i>Podosphaera xanthii</i>), hongos de la raíz (<i>Pythium</i> sp.).		Aplicación foliar para oídios: 2-3 aplicaciones cada 3-4 días. Aplicación al suelo para enfermedades de raíz y semillero: 2 - 3 aplicaciones cada 3-4 días.
Tomate	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>), septoria (<i>Septoria lycopersici</i>)		Aplicar desde las primeras inflorescencias visibles cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. 2 aplicaciones cada 14 días.
Fresa y frambuesa	<i>Botrytis cinerea</i> , oídio (<i>Podosphaera aphanis</i>), <i>Phytophthora fragariae</i> y otros hongos como <i>Colletotrichum acutatum</i>		Las aplicaciones se pueden realizar durante el ciclo de cultivo. Realizar 4-8 aplicaciones cada 5-14 días.
Patata	<i>Phytophthora infestans</i> , <i>Alternaria solani</i> , oídio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)		Aplicar cuando aparezcan condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad. Se recomiendan de 2-4 aplicaciones con un intervalo de aplicación de 5-15 días.
Ornamentales	<i>Marsonia</i> spp., <i>Phragmidium mucronatum</i> , oídio y mildiu		1 aplicación foliar cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad.