

**COMPOSICIÓN.**Extracto de ortiga (*Urtica spp.*) 1,50 % p/v (15 g/l)**PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS.**Totalmente soluble  
Densidad: 1 g/cc  
pH: 6,75**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS.**

ORTITEC-S contiene extracto de *Urtica dioica*, rico en principios activos con actividad fungicida, insecticida y acaricida. Es una materia prima adecuadamente seleccionada, cosechada y procesada -extracción y dilución- en España según los Reglamentos de ejecución (UE) 2017/419 y 1107/2015.

**RECOMENDACIONES DE USO. DOSIS.**

ORTITEC-S es eficaz frente a enfermedades fúngicas provocadas por oídio o ceniza, mildiu, alternaria, botrytis, monilia, lepra, sarna o moteado, etc. y contra insectos como pulgones, lepidópteros y ácaros tetránquidos.

Aplicar vía foliar de forma preventiva cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad a una dosis general de 5-10 cc/l.

Puede aplicarse al suelo a una dosis general de 5-10 l/ha, incluido en el acolchado o mulch para evitar enfermedades fúngicas que causan podredumbres en el cuello y en la raíz y para disminuir la densidad de propágulos en el suelo.

Puede repetirse el tratamiento en caso de necesidad cada 7 días en función de las necesidades, realizando 2-6 aplicaciones. Plazo de seguridad (PS): 7 días.

ENFERMEDAD	CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
Mildiu	Uva de mesa y viña, patata.	5-10 cc/l	Comenzar las aplicaciones foliares con condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad. 2-6 aplicaciones cada 7 días durante el cultivo. PS: 7 días.
Oídio	Hortícolas (pepino, calabacín, calabaza) Frutales (Manzano, ciruelo, melocotonero, cerezo) y vid		
Alternaria, tizón temprano	Frutales (Manzano, ciruelo, melocotonero, cerezo), hortícolas de hoja (brócoli, coliflor) y de fruto (pepino, calabacín, melón, calabaza)		
Botrytis, Monilia y enfermedades post-cosecha.	Manzano, ciruelo, melocotonero, cerezo.		
Sarna o moteado, Lepra			
Alternaria, tizón temprano	Frutales (Manzano, ciruelo, melocotonero, cerezo), hortícolas de hoja (brócoli, coliflor) y de fruto (pepino, calabacín, melón, calabaza)		
Pulgón, Lepidópteros y ácaros. Carpocapsa.	Frutales (Manzano, peral, ciruelo, melocotonero, cerezo, nogal), hortícolas de hoja (brasicáceas, lechuga) y de fruto (judías, patata)	Aplicar cuando aparezcan condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la plaga y en presencia de la misma. 1-5 aplicaciones cada 7 días durante el cultivo. PS: 7 días.	
Enfermedades que afectan al cuello y a las raíces	Todos	5-10 l/ha	Aplicación al suelo (acolchado o mulch)

**ENVASES DISPONIBLES:** 5 L, 20 L, 1000 L