

**COMPOSICIÓN.**

Nitrógeno (N) total	2,5 % p/p	3,0 % p/v
Nitrógeno (N) orgánico	2,5 % p/p	3,0 % p/v
Aminoácidos libres	14,5 % p/p	17,0 % p/v
Aminograma:		
Glicina	14,5 % p/p	17,0 % p/v
AATC	5,0 % p/p	6,0 % p/v

Aminoácidos de síntesis

Clase A : Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS.

Totalmente soluble

Densidad : 1,18 g/cc

pH : 6,5

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS.

ACTIMAR® es un bioestimulante especial a base de aminoácidos. El AATC, precursor del aminoácido L-cisteína, es un aminoácido implicado en el metabolismo de los grupos tiólicos que activan los sistemas enzimáticos y metabólicos más importantes en el interior de la célula relacionados con el aumento de la productividad. Además, multiplica la proporción de prolina, aminoácido natural que producen las plantas para defenderse ante situaciones de estrés.

RECOMENDACIONES DE USO. DOSIS.

- Cítricos : 50-75 cc/hl, en pre-brotación, caída de pétalos y crecimiento del fruto.
- Frutales de pepita/hueso/tropicales : 45-65 cc/hl, desde la caída de pétalos, cada 15-20 días.
- Hortícolas, fresa : 50-80 cc/hl, en trasplante, floración y crecimiento del fruto.
- Olivo y vid : 30-50 cc/hl, desde la floración hasta el engorde de frutos, 2-3 aplicaciones.
- Cultivos industriales, patata, remolacha : 0,5 l/ha, en la fase de crecimiento o ante situaciones de estrés.

ENVASES DISPONIBLES: 1 L, 5 L