

**COMPOSICIÓN.**

Aminoácidos libres	6 % p/p
Nitrógeno (N) total	11 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico	10,5 % p/p

AMINOGRAMA: % p/p: Ala 0,71 ; Asp 0,50 ; Glu 0,73 ; Gly 0,73; Leu 0,39; Pro 0,57; Ser 0,63; Thr 0,88; Val 0,34 Otros (Arg, His, Ile, Lys, Met, Phe, Tyr): 0,52

Los aminoácidos provienen de la hidrólisis ácida de productos proteicos de origen vegetal.

Clase A : el contenido en metales pesados es inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

Información facultativa: Betaína (Glicina-betaína > 80% p/p; CAS: 203-490-6)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS.

pH (1%): 8,5

Polvo completamente soluble

Solubilidad : 250 g/l (25°C)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS.

MARLOX GB es un fertilizante orgánico compuesto por una selección de aminoácidos con función osmoprotectora.

Su efecto osmoprotector mejora la respuesta de las plantas frente a situaciones causadas por temperaturas extremas, salinidad, escasez hídrica, etc.

MARLOX GB reduce la incidencia de fisiopatías derivadas del estrés hídrico como el aborto de flores y frutos recién cuajados, el cracking y las malformaciones en frutos o estructuras vegetales. Aplicado durante la maduración, adelanta y uniformiza la coloración de los frutos.

RECOMENDACIONES DE USO. DOSIS.**APLICACIÓN FOLIAR:**

- Cítricos : 150-250 g/hl , al 75% y al 100% de pétalos caídos.
- Frutales de hueso y pepita (cerezo, melocotonero, etc.), higuera y olivo : 300-500 g/hl, al inicio de la floración (olivo) y en envero de frutos.
- Vid y parral : 2-4 kg/ha , fin de floración, cierre de racimos y antes de cosecha.
- Hortícolas de fruto : 2-4 kg/ha , en la floración de cada piso.
- Hortícolas de hoja : 2-4 kg/ha en trasplante y a mitad del ciclo.

FERTIRRIGACIÓN: 2-4 kg/ha/aplicación.

ENVASES DISPONIBLES: 1 Kg, 5 Kg