

**COMPOSICIÓN.**

Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	22,5 % p/p
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en citrato amónico neutro y agua	22,5 % p/p
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	18,0 % p/p
Boro (B) soluble en agua	5,5 % p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua	3,5 % p/p
Extracto puro de algas (<i>Ascophyllum nodosum</i>)	
Manitol	1,0 % p/p

Arsénico (As) < 50 mg/kg; Pobre en cloruro (< 2%)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS.

Totalmente soluble

pH (1%) : 6,40.

Conductividad eléctrica: 5,38 dS/m

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS.

Nacar® Floramax es una formulación que combina de forma balanceada fósforo, potasio, boro y molibdeno, elementos implicados en el proceso de floración y amarre de frutos.

Nacar® Floramax aporta nutrientes de alta asimilación durante etapas decisivas del desarrollo vegetal, momentos en los cuales se hace necesario provocar una reacción rápida que repercuta sobre la producción.

Nacar® Floramax predispone a la planta a una abundante floración y a un mejor cuajado y fructificación de calidad. Se recomienda su aplicación para acentuar la inducción y la diferenciación floral y crear un efecto sumidero en los órganos de reserva que disminuya su caída o abscisión.

RECOMENDACIONES DE USO. DOSIS.**APLICACIÓN FOLIAR:**

• Cítricos, frutales, olivo y vid: 100-250 g/hl, desde prefloración hasta el inicio de la floración (10 % flores abiertas) y/o tras la caída de pétalos. Aplicar antes de la caída fisiológica para reducir la abscisión.

• Cultivos hortícolas: 100-150 g/hl, en prefloración y tras la fecundación de flores para evitar el aborto de frutos. Repetir el tratamiento en caso necesario en las sucesivas floraciones.

Se recomienda aplicar Nacar® Floramax cuando los niveles de boro y molibdeno en el suelo sean bajos, para prevenir o corregir deficiencias de estos micronutrientes y en fases de mayor crecimiento vegetativo.

En cultivares con tendencia a la caída de frutos recién cuajados o situaciones desfavorables que puedan provocarla se puede repetir el tratamiento durante la fase inicial de desarrollo del fruto.

FERTIRRIGACIÓN: 4-6 kg/ha/aplicación.

ENVASES DISPONIBLES: 1 kg, 5 kg