

**COMPOSICIÓN.**

Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua	8 % p/p
Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua	14 % p/p
Boro (B) total soluble en agua	0,25 % p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,15 % p/p
Manganeso (Mn) quelatado por EDTA	0,11 % p/p
Extracto puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	
Ácido alginico	0,9 % p/p
Manitol	0,25 % p/p

Se garantiza la estabilidad de la fracción quelatada en el intervalo de pH: 4-10.

Arsénico (As) < 50 mg/ kg.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS.

Totalmente soluble

Densidad : 1,29 g/cc

pH : 9

Conductividad eléctrica: 4,05 dS/m

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS.

Los nutrientes de NATKEL® participan en el metabolismo de los azúcares y del nitrógeno y en numerosos sistemas enzimáticos, entre otras muchas funciones vitales de la planta.

Los alginatos potásicos actúan directamente y proporcionan efectos de acción inmediata sobre los frutos. Indicado para aumentar el tamaño del fruto, NATKEL® favorece además la coloración y el índice de azúcares disueltos.

RECOMENDACIONES DE USO. DOSIS.

· Aplicación foliar : 300-400 cc/hl

· Fertirrigación : 10-15 l/ha

Realizar dos aplicaciones durante la fase de crecimiento de frutos, la primera justo después del cuajado y la segunda a los 15-20 días.

ENVASES DISPONIBLES: 1 L, 5 L, 20 L