

**COMPOSICIÓN.**

Aminoácidos libres	7,2 % p/p
Nitrógeno (N) total	2,5 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico	2,4 % p/p
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua	3,2 % p/p
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua	2,5 % p/p

Aminograma: Ala 0,59 % p/p ; Asp 0,80 % p/p ; Gly 0,87 % p/p ; Leu 0,97 % p/p ; Lys 0,56 % p/p ; Phe 0,57 % p/p ; Val 0,60 % p/p ; Otros (Arg, Glu, His, Ile, Met, Pro, Ser, Tyr y Thr) 2,24 % p/p.

Los aminoácidos provienen de la hidrólisis enzimática de productos proteicos de origen vegetal.

Clase A: el contenido en metales pesados es inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS.

Totalmente soluble

Densidad : 1,17 g/cc

pH : 5

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS.

SUPRAVIT es un estimulante radicular formulado expresamente para reactivar la fertilidad biológica del suelo y mejorar el entorno de las raíces. El cultivo adquiere un desarrollo más fuerte, sano y vigoroso que contribuye a retrasar la senescencia y a aumentar su productividad.

El complejo orgánico de SUPRAVIT potencia la interacción entre las rizobacterias, las micorrizas y las raíces. Aporta moléculas químicamente similares a los exudados radiculares producidos por las plantas para nutrir a los microorganismos promotores del crecimiento vegetal (microorganismos eficientes).

Es un complemento perfecto a los fertilizantes convencionales aplicados al suelo. Su uso regular mejora sustancialmente la fertilidad general : la floculación de arcillas, la permeabilidad y la asimilación de agua y nutrientes.

A nivel de cultivo, SUPRAVIT produce plantas con un sistema radicular más robusto y sano, mejor nutridas, más productivas y con mayor facilidad para formar nuevos tejidos, tanto vegetativos como reproductivos.

RECOMENDACIONES DE USO. DOSIS.

Iniciar los tratamientos al comienzo de la actividad vegetativa, tras la siembra o trasplante, y repetir durante la floración-cuajado y el desarrollo de órganos de reserva.

Si se aplica de forma regular durante la etapa de fructificación alarga la vida productiva del cultivo, retrasa el momento de senescencia y mantiene la calidad de las últimas cosechas.

Realizar aplicaciones regulares cada 15-20 días en caso de necesidad.

· FERTIRRIGACIÓN : 10-15 l/ha/aplicación.

ENVASES DISPONIBLES: 1 L, 5 L, 20 L